

# Życica trwała BOKSER

Hodowla Roślin Bartązek Sp. z o.o. Grupa IHAR tel. 0 605 829 744

**Opis botaniczny:** odmiana diploidalna 2n, wczesna, wysokość roślin do 60cm, ciemnozielonej barwie liścia.

## Cechy użytkowe

1. Typ użytkowania – **odmiana trawnikowa, przeznaczona na trawniki i boiska sportowe.**

2. Cechy użytkowe:

- odmiana trwała, tworzy zwartą i gęstą darni,

- dobrze znosi częste i niskie koszenie,

Rośliny mało podatne na choroby zimowe oraz letnie choroby liści i pędów,

## Wartość trawnikowa życicy trwałej Bokser w porównaniu do odmian wzorcowych. Średnia z lat 1999-2002, z dwóch miejscowości.

Lp.	Cechy odmiany	Prze-zimowanie	Ogólny aspekt	Wskaźnik jakości trawnika	Zimozieloność
1	<b>Bokser</b>	<b>6,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,5</b>	<b>5,7</b>
2	Aut	5,5	6,8	6,8	5,6
3	Stadion	5,1	6,4	6,2	6,4
4	Stoper	4,6	6,2	6,6	6,7
5	Taya	5,7	6,2	6,3	5,6
6	Barball	5,5	6,3	6,5	5,9
7	Dariusz	4,8	6,7	7,2	5,6
8	Talgo	5,5	6,1	6,2	5,4

## Produkcja nasienna

1. Duży potencjał plonu nasion 10-15dt/ha,
2. Termin dojrzewania – przed zniwami rzepakowymi, 2-3 tygodnie wcześniej od odmiany Stadion.
3. Zalecany wysiew na plantacji nasiennej 8-10kg/ha (maksymalnie 10kg/ha).
4. Zakładanie plantacji nasiennych w siewie czystym w okresie późnoletnim oraz wiosną jako wsiewka w zboża jare.
5. Niszczenie chwastów dwuliściennych w zbożach środkami Aminopielik D 450 SL 3l/ha lub Chwastox D 179 SL 5l/ha.
6. Niszczenie chwastów dwuliściennych po zbiorze rośliny ochronnej mieszanką Chwastox Extra 300SL 1,5/ha, Aminopielik D 1,5l/ha i Starane 250 SL 0,6l/ha.
7. Niszczenie chwastów dwuliściennych i jednoliściennych(miotła zbożowa, wiechlina roczna, chwastnica - kurze proso) jesienią w końcu września lub wczesną wiosną środkiem Stomp 330 EC w dawce 5l/ha.
8. Zapobieganie białokłosości- niszczenie roztocza i owadów. Oprysk środkiem Owadofos 540 EC(1l/ha) lub Decis 2,5EC (0,3l/ha) w okresie strzelania w źdźbło, przed pojawieniem się kłosa.
9. Możliwość zastosowania antywylegacza w fazie początku strzelania źdźbło – oprysk środkiem Cycocel 460 SL w dawce 3l/ha
10. Możliwość stosowania środków przyspieszających i wyrównujących dojrzewanie łąnu – Reglone 200 SL 2-3l/ha + zwilżacz lub Roundup do 3l/ha.
11. Możliwość zbioru jednofazowego kombajnem przy pełnej dojrzałości nasion.
12. Zalecany okres użytkowania plantacji nasiennych 2 lata.