

Życica trwała STOPER

Hodowla Roślin Bartązek Sp. z o.o. Grupa IHAR tel. 0 605 829 744

Opis botaniczny: odmiana diploidalna 2n, późna, niska, barwa liści ciemnozielona, liść delikatny,
Cechy użytkowe

1. Typ użytkowania – **odmiana trawnikowa, przeznaczona na wszystkie rodzaje trawników, a zwłaszcza do intensywnego użytkowania (boiska sportowe) oraz do warunków cienia (park).**

2. Cechy użytkowe: duże zagęszczenie runi, tolerancja na ścieranie i szybka regeneracja, powolne odrastanie po skoszeniu, duża odporność na zacienianie.

Wartość trawnikowa życicy trwałej Stoper w porównaniu do odmian wzorcowych. Średnia z lat 1999-2002, z dwóch miejscowości.

Lp.	Cechy odmiany	Prze- zimowanie	Ogólny aspekt	Wskaźnik jakości trawnika	Zimo zieloność
1	Stoper	4,6	6,2	6,6	6,7
2	Stadion	5,1	6,4	6,2	6,4
3	Bokser	6,2	6,6	6,5	5,7
4	Aut	5,5	6,8	6,8	5,6
5	Taya	5,7	6,2	6,3	5,6
6	Barball	5,5	6,3	6,5	5,9
7	Dariusz	4,8	6,7	7,2	5,6
8	Talgo	5,5	6,1	6,2	5,4

Produkcja nasienna

1. Duży potencjał plonu nasion 10-15dt/ha,
2. Łatwość wymłacania nasion
3. Termin dojrzewania – przed żniwami zbożowymi, około 20 lipca.
4. Zalecany wysiew na plantacji nasiennej 8-10kg/ha (maksymalnie 10kg/ha).
5. Zakładanie plantacji nasiennych w siewie czystym w okresie późnoletnim oraz wiosną jako wsiewka w zboża jare.
6. Niszczanie chwastów dwuliściennych w zbożach środkami Aminopielik D 450 SL 3l/ha lub Chwastox D 179 SL 5l/ha.
7. Niszczanie chwastów dwuliściennych po zbiorze rośliny ochronnej mieszanką Chwastox Extra 300SL 1,5/ha, Aminopielik D 1,5l/ha i Starane 250SL 0,6l/ha.
8. Niszczanie chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (miotła zbożowa, wiechlina roczna, kurze proso) jesienią w końcu września lub wczesną wiosną herbicydem Stomp 330EC w dawce 5l/ha.
9. Zapobieganie białokłosości- niszczenie roztocza i owadów. Oprysk środkiem Owadofos 540 EC(1l/ha) lub Decis 2,5EC (0,3l/ha) w okresie strzelania w źdźbło, przed pojawieniem się kłosa.
10. Możliwość zastosowania antywylegacza w fazie początku strzelania źdźbło – oprysk środkiem Cycocel 460 SL w dawce 3l/ha
11. Możliwość stosowania środków przyśpieszających i wyrównujących dojrzewanie łąnu – Reglone 200 SL 2-3l/ha + zwilżacz lub Roundup do 3l/ha.
12. Możliwość zbioru jednofazowego kombajnem przy pełnej dojrzałości nasion.
13. Zalecany okres użytkowania plantacji nasiennych 2 lata.