

Życica trwała BAJKA


Hodowla Roślin Bartązek Sp. z o.o. Grupa IHAR tel. 0 605 829 744

Opis botaniczny: odmiana diploidalna 2n, średniowczesna, wysokość rośliny średnia, barwa liścia zielona, duży udział pędów generatywnych.

Cechy użytkowe

1. Typ użytkowania – **odmiana pastewna, przeznaczona do mieszanek kośnych i pastwiskowych. Może być stosowana do zagospodarowania zdegradowanych użytków zielonych. Może być stosowana do podsiewu punktowego darni, pastwiska po kretowiskach i wypadach roślin.**

2. Cechy użytkowe: odmiana Bajka charakteryzuje się wysokim plonem zielonej i suchej masy o dobrej jakości – strawności i smakowitości. Dobrze znosi wielokrotne koszenie, przygryzanie i udeptywanie. Szybko odrasta po koszeniu. Charakteryzuje się dobrym przezimowaniem i trwałością roślin. Mało podatna na choroby liści i pędów.



Produkcja nasienna

1. Duży potencjał plonu nasion 10-15dt/ha,
2. Termin dojrzewania – w połowie lipca, przed zniwami zbożowymi.
3. Zalecany wysiew na plantacji nasiennej 8-10kg/ha (maksymalnie 10kg/ha).
4. Zakładanie plantacji nasiennych w siewie czystym w okresie późnoletnim oraz wiosną jako wsiewka w zboża jare.
5. Niszczanie chwastów dwuliściennych w zbożach środkami Aminopielik D 450 SL 3l/ha lub Chwastox D 179 SL 5l/ha.
6. Niszczanie chwastów dwuliściennych po zbiorze rośliny ochronnej mieszanką
7. Chwastox Extra 300SL 1,5/ha, Aminopielik D 1,5l/ha i Starane 250SL 0,6l/ha.
8. Niszczanie chwastów dwuliściennych i jednoliściennych(miotła zbożowa, wiechlina roczna, kurze proso) jesienią w końcu września lub wczesną wiosną herbicydem Stomp 330EC w dawce 5l/ha.
9. Zapobieganie białokłosości- niszczenie roztocza i owadów. Oprysk środkiem Owadofos 540 EC(1l/ha) lub Decis 2,5EC (0,3l/ha) w okresie strzelania w źdźbło, przed pojawieniem się kłosa.
10. Możliwość zastosowania antywylegacza w fazie początku strzelania źdźbło – oprysk środkiem Cycocel 460 SL w dawce 3l/ha
11. Możliwość stosowania środków przyspieszających i wyrównujących dojrzewanie łanu – Reglone 200 SL 2-3l/ha + zwilżacz lub Roundup do 3l/ha.
12. Możliwość zbioru jednofazowego kombajnem przy pełnej dojrzałości nasion.
13. Zalecany okres użytkowania plantacji nasiennych 2 lata.